

عوارض جانبی :

عوارض جانبی این داروها نادر است. سرفه های خشک در ابتدا مصرف این دارو ممکن است دیده شود که پس از مدتی از بین می رود، در صورتی که برطرف نشد، با پزشک برای تغییر میزان یا نوع دارو مشورت کنید.

احساس سرگیجه نیز در ابتدای مصرف دارو کاملا طبیعی است و تنها نکته ای که باید در نظر گرفته شود، توجه در هنگام بلند شدن از تخت خواب است که باعث افتادن و صدمه نشود.



برخی از عوارض جانبی دیگر:

- سردرد
- احساس خستگی
- از دست دادن اشتها
- ناراحتی معده
- اسهال
- بی حسی
- تب
- خارش پوست یا تاول
- درد مفاصل

و کلام آخر....

در صورتی که زبان و لب های شما متورم شد، سریعاً به مراکز اورژانس مراجعه کنید، زیرا شما دچار واکنش های حساسیتی جدی این داروها شده اید، که بسیار نادر است

منبع : <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus>

مددجوی گرامی خواهشمند است فایل های بارگزاری شده در سایت بیمارستان (www.javadalaemehosp.ir) با عنوان (آموزش به بیمار) جهت مراقبت اثربخشی از بیمار در منزل را مطالعه فرمایید و همچنین در صورت نیاز به هرگونه مشاوره بالینی با شماره تلفن:

05131841-3 داخلی ۲۵۱ (کلینیک پرستاری آموزش سلامت)

همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۲

تماس حاصل فرمایید.

آدرس: مشهد-بلوار وکیل آباد- بلوار هنرستان



بیمارستان تخصصی قلب عروق جوادالائمه علیه السلام

شماره سند : TR/QI/199
گروه هدف : بیماران و همراهیان
تاریخ بازنگری : ۱۴۰۳/۰۱/۰۵
تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
ویرایش : ۰۳

داروهای مهارکننده آنزیم

مبدل آنژیوتانسین

(کاهنده فشارخون)

آموزش به بیمار و همراهیان

نکاتی که باید در هنگام استفاده از این داروها در نظر گرفته شود:

- از مصرف همزمان این داروها با ایبوپروفن (Motrin ، Advil) ، آسپرین و ناپروکسن (Aleve) خودداری کنید و قبل از آن با پزشک مشورت کنید.
- در صورتی که از داروهای دیگر مانند داروهای بدون نسخه پزشک، دیورتیک ها (مدرها) ، قرص های پتاسیم و یا مکمل های گیاهی و غذایی، استفاده می کنید، پزشک را در جریان قرار دهید.
- این داروها در زمان حاملگی و شیردهی منع مصرف دارد.



این داروها در درمان فشار خون بالا، سکته مغزی، حملات قلبی و همین طور در کاهش خطر ابتلا به سکته مغزی یا حمله قلبی استفاده می شود، این داروها همچنین برای درمان دیابت و مشکلات کلیوی نیز مصرف میشود.

مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین به شل شدن و انبساط عروق خونی کمک می کنند، در نتیجه مانع از افزایش فشار خون در عروق و افزایش کارکرد قلب می-شود.

این داروها با نام ها و مارک های مختلف در بازار موجود است و از نظر کارایی تفاوتی باهم ندارند و تنها تفاوت آنها در عوارض جانبی آنها می باشد

بیمار گرامی

مطالعه این پمفلت آموزشی به آن دسته از بیمارانی که دارای فشار خون بالا هستند و از داروهای مهار کننده ی آنزیم مبدل آنژیوتانسین استفاده می کنند، توصیه می شود.



دارو های مهار کننده ی آنزیم مبدل آنژیوتانسین

بنازپریل (Lotensin) benazepril

کاپتوپریل captopril

انالاپریل (Vasotec) enalapril

فوزینوپریل fosinopril

لیزینوپریل (prinivil) Zestril ، lisinopril

موئکسی پریل (Univasc) moexipril

پریندوپریل (Aceon) Perindopril

کوئیناپریل (Accupril) quinapril

رامیپریل (Altace) ramipril

تراندولاپریل (Mavik) trandolapril