




جداشدن لایه های سرخسری

دایسکشن آئورت چه خطراتی می تواند به همراه داشته باشد ؟



مددجوی گرامی خواهشمند است فایل های بارگزاری شده در سایت بیمارستان (www.javadalaemehosp.ir) با عنوان (آموزش به بیمار) جهت مراقبت اثربخشی از بیمار در منزل را مطالعه فرمایید و همچنین در صورت نیاز به هرگونه مشاوره بالینی با شماره تلفن:

چه آزمایشات و معایناتی می تواند نشان دهنده این مشکل در سرخرگ آئورت باشد ؟

جداشدن لایه های سرخرگ آنورت شرایطی بسیار مخاطره آمیز است و باید به سرعت درمان شود. درمان این حالت انجام جراحی است که برای آن دو تکنیک وجود دارد :


دایسکشن آنورت چیست ؟

دایسکسیون آنورت شرایطی است که طی آن آسیب جدی به لایه های بزرگترین رگ حمل کننده خون در بدن یعنی آنورت وارد می شود . در این حالت بین لایه های داخلی آنورت پارگی ایجاد می شود و خون می تواند بین این لایه ها نفوذ کند . این نفوذ خون می تواند منجر به پارگی آنورت یا کاهش خورسانی به اندام ها از طریق این رگ شود .

علل بروز دایسکشن آنورت چیست ؟

سرخرگ آنورت وقتی از قلب جدا می شود در ابتدا از میان قفسه سینه به سمت سر و گردن عبور میکند (که به آن آنورت صعودی می گویند) بعد از آن با ایجاد قوس نهایتا به سمت پایین می آید و از قفسه سینه و شکم عبور می کند . (که به آن آنورت نزولی می گویند)

معمولا دایسکشن آنورت به علت جداشدن لایه های آن و دنبال آسیب به لایه های داخلی ایجاد می شود و معمولا در قسمتی از آنورت که در قفسه سینه است پیش می آید .



جدا شدن لایه های داخلی منجر به ایجاد دو مسیر می شود :

- یک مسیر برای انتقال خون در رگ
- یک مسیر که خون در آن می ماند

اگر مسیری که خون داخل آن باقی می ماند بزرگ تر شود ، می تواند منجر به تنگ شدن مسیری انتقال خون شود .

جدا شدن لایه های آنورت همچنین می تواند منجر به گشاد شدن یا باد شدن آنورت شود که به آن **آنوریسم** می گویند .

علت اصلی ایجاد دایسکشن آنورت مشخص نیست اما موارد زیر می تواند منجر به افزایش خطر بروز آن شوند :

- سن بالا
- آترواسکلروزیس (فرایند سخت شدن دیواره عروق به دنبال تشکیل پلاک ها)
- فشارخون بالا
- وارد شدن آسیب قفسه سینه مثلا آسیب فرمان ماشین به بدن در تصادفات رانندگی

دیگر مشکلات و شرایط مرتبط با دایسکشن آنورت شامل :

- دریچه آنورت دو لتی
- تنگی سرخرگ آنورت
- انجام عمل جراحی قبلی
- بارداری

دایسکشن آنورت در هر ۲ نفر از ۱۰ هزار نفر دیده می شود و معمولا در سنین ۴۰ تا ۷۰ سالگی ایجاد می شود .

دایسکشن آنورت چه علائمی دارد ؟

در بسیاری از موارد ، علائم به طور ناگهانی بروز می کنند و شامل درد شدید قفسه سینه هستند . این درد مانند درد حمله قلبی حس می شود . این درد معمولا به صورت تیز ، ضربه زدن و شکافنده توصیف می شود . این درد زیر استخوان جناق سینه حس می شود و به سمت شانه ها و پشت انتشار می یابد . درد در موقعیت های مختلف احساس می شود ، اغلب در شرایطی که دایسکشن آنورت وخیم تر باشد در پاها و دست ها احساس می شود.

***دیگر علائم در نتیجه کاهش خورسانی به بدن در ناحیه بعد از محل دایسکشن در آنورت است و میتواند شامل :

- اضطراب
- گیجی و غش کردن
- عرق کردن شدید
- تهوع و استفراغ
- پوست رنگ پریده
- نبض ضعیف و تند
- تنگی نفس مخصوصا در حالت دراز کشیده

